

# MicroMega One RECI / MicroMega One RECI Procedure Pack / MicroMega One RECI Assorted NiTi Root Canal Instruments

Só pode ser usado por profissionais na área de odontologia.

2. Contraindicações

Existe contraindicação para uso em dentes com mais de 20 anos de idade. Osteo-élastico é rígido e não é resistente ao processo endodontico. Existe contraindicação para utilização de MicroMega One RECI para o tratamento endodontico de dentes com traumas.

3. Complicações

Em casos de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Avisos e precauções

A advertência de uso é destinada a informar os profissionais de saúde que existem riscos associados ao uso do dispositivo.

5. Indicações-clínica

MicroMega One RECI em condições normais.

6. Recomendações

MicroMega One RECI é recomendado para uso em rotas de canal durante o tratamento endodontico.

7. Protocolo

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em tres ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Indicações de uso

One RECI deve ser usado durante o tratamento endodontico.

9. Disposal

After use, instruments must be placed in a secure container, used to collect cutting or sticking instruments (like needles or disposable blades) as per good dentistry practices.

10. Symbols

NITI NiTi aw material CLASSICS® Handgriff Kontinuierliche Rotation MD Medisprodukt

Quantity Assortment

<CLASSICS> Handle Do not use if packaging's damaged

Continuous rotation MD Medical device

Reciprocating motion -

Year of CE marking: 2021

Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em três ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Instruction de stockage et transport

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

9. Mise au rebut

Après utilisation, les dispositifs doivent être déposés dans un conteneur stérile pour éliminer les déchets de l'endodontie.

10. Symboles

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

En los casos de una anatomía compleja se pueden producir riesgos durante el procedimiento de endodoncia. Se recomienda el uso de instrumentos alternativos.

11. Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em três ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Instruction de stockage et transport

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

9. Mise au rebut

Après utilisation, les dispositifs doivent être déposés dans un conteneur stérile pour éliminer les déchets de l'endodontie.

10. Symboles

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

11. Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em três ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Instruction de stockage et transport

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

9. Mise au rebut

Après utilisation, les dispositifs doivent être déposés dans un conteneur stérile pour éliminer les déchets de l'endodontie.

10. Symboles

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

11. Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em três ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Instruction de stockage et transport

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

9. Mise au rebut

Après utilisation, les dispositifs doivent être déposés dans un conteneur stérile pour éliminer les déchets de l'endodontie.

10. Symboles

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

11. Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

Procedimento de utilização:

Movimento progressivo em três ondas (3 movimentos de arrabio a abvio com movimento de limado circular ascendente, estreita a largar) com o instrumento em direção ao fundo do canal.

8. Instruction de stockage et transport

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

9. Mise au rebut

Après utilisation, les dispositifs doivent être déposés dans un conteneur stérile pour éliminer les déchets de l'endodontie.

10. Symboles

Symbol auf Verpackung mit Ethylenoxid sterilisiert, Nicht wiederverwendbar

11. Instructions d'utilisation

1. Indication

One Flare - Evidente coronária durante um tratamento endodontico não quirúrgico.

2. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

3. Complications

No caso de complexo anatoma, per-operativa risks (instrumental breakage, stranding, instrument fracture, false path, perforation...) considerar a utilização de instrumentos alternativos.

4. Warnings and precautions

O dispositivo deve ser usado em endodontics instrument must be related to the clinical case in particular for a canal anatomy complex.

5. Indications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

6. Contraindications

As indicações de uso devem ser respeitadas em particular para a clínica endodontica.

7. Procedure

EWL: longiflex de trabalho estimado

